

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 13-4-71 172031

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION "AQUITAINE" (Tél. (56) 92.06.25

GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES, PYRÉNÉES ATLANTIQUES

ABONNEMENT ANNUEL

Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes, Direction Départementale de l'Agriculture
Chemin d'Artigues, 33-CENON

25 F.

C. C. P. : BORDEAUX 6702-46

Supplément N° 2 au Bulletin Technique N° 127 D'AVRIL 1971

1971-9

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER

Le développement de la végétation devient assez rapide; Pour protéger les organes verts apparus depuis le dernier traitement il est recommandé de prévoir une nouvelle pulvérisation en maintenant l'intervalle minimum de 7 à 8 jours entre deux applications.

OIDIUM DU POMMIER

Les traitements précoces sont les plus efficaces, pour diminuer les possibilités de développement de la maladie. Sur les variétés sensibles, jonathan, golden, ..., ajouter à la bouillie destinée à combattre la tavelure un produit anti-oidium choisi dans la liste du bulletin technique N° 126 de mars 1971. Ceci est inutile dans la plupart des vergers, sur les variétés rouges peu sensibles à l'oidium.

ARACHNÉES ROUGES (Panonychus ulmi)

Les premières éclosions sont observées dans les situations les plus chaudes; Il est encore trop tôt pour intervenir.

Bordeaux, le 9 avril 1971

L'Ingénieur d'Agronomie
chargé des Avertissements Agricoles

J. TOUZEAU

P. le Chef de la Circonscription phytosanitaire
" Aquitaine " et par Délégation
L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
C. ROUSSEL

Imprimerie de la Station de Bordeaux
Directeur-Gérant: L. BOUYX

P 419